

تداخلات :

بیلی روبین تا 15 mg/dl ، هموگلوبین تا 500 mg/dl ، نری گلیسرید تا 800 mg/dl تأثیری بر نتیجه آزمایش ندارند .

REFERENCES:

- 1-Fossati P.P., Clin.Chem.,28(1982)2077
- 2- Bucolo G ., David H ., Clin.Chem., 19 (1973)475
- 3-Trinder P.-Ann Clin. Biochem 6124(1969).
- 4-Abell, L.L.; Levy, B.B.; Kendall, F.E.:J. Biol. Chem. 195-357(1952).
- 5-Castelli, W.P. - Current Prescribing 6177:39(1977).
- 6-Westgard J. O., Barry P.L., Hunt M.R., Growth T.A multi-rule Stewart chart quality 7-Control in clinical chemistry. Clin.Chem, 27:493-501, 1981.
- 8-Burchard, H., Chem. Fentr. 61:25 (1890).
- 9-Roeschlau, P., et al, Z. Kiln. Chem. Kiln. Biochem 12:226 (1974).
- 10-Young, D.S., et al, Clin. Chem. 21:1D (1975).
- 11-National Institute of Health Publication No. 88- 2926 "Detection, Evaluation, and Treatment of High Cholesterol in Adults", November (1987)

توضیحات علائم و نماد های بکار رفته در برچسب جعبه و ویال کیت

تاریخ تولید	
تاریخ انقضاء	
شماره اختصاصی سری تولید	LOT
شماره اختصاصی محصول	REF
آدرس محل تولید	
احتیاط مصرف	
دستورالعمل استفاده	
دمای نگهداری	
محصول آزمایشگاهی	IVD
بدور از تابش مستقیم آفتاب	
بدور از بارش باران	
جهت بالا	
محتوا	
خطر زیستی	
مقدار	QTY
معرف آماده مصرف	REAG R

M E T A K I T